




观赏草 -
花园设计的艺术

好的观赏草是结构、质地和灵动的代名词

正确的基调可以使一个花园变成一件艺术品。

班纳利的观赏草为花园提供风骨，助力您为客户打造一系列完整的组合。

从我们的产品库中进行挑选，总有一款产品适合你的场景，打造出独特的吸睛利器。



坡地毛冠草 大草原 / *Melinis nerviglumis Savannah*

标志与符号说明

	种苗栽培时间		光照要求
	成品栽培时间		种子形式
	作物栽培时间* (从播种到销售)		耐热区 (AHS)
	植株高度		耐寒区 (USDA)
	植株冠幅		
园艺符号			
	一年生		多年生/宿根
	切花		

*理想栽培时间会因当地条件而有所差异

每穴播种粒数： 288 / 128 穴种苗可移植到72-21穴的大穴盆中。每穴播种5-7粒，增加3-4周种苗时间和缩减3周的成品生产时间。

每盆种植株数： 加仑盆 / 30 厘米盆。对2加仑/60-90厘米盆来说，成品生产时间增加3周。每盆种子/种苗数量越多，成品生产周期越短。

盆径： 夸脱盆 / 10-13 厘米



苔草 卓娜 / *Carex comans Zora*

所有观赏草一览



莎草 / *Cyperus glaber* ◯
艾比 / Abby



兔尾草 / *Lagurus ovatus* ◯
小兔子 / Bunny



芒颖大麦草 / *Hordeum jubatum* ◯
粉雾 / Ricky



坡地毛冠草 / *Melinis nerviglumis* ◯ ×
大草原 / Savannah



长柔毛狼尾草 / *Pennisetum villosum* ◯ ×
茸毛 / Fluffy



苔草 / *Carex comans* ◯
卓娜 / Zora



蓝羊茅 / *Festuca valesiaca* var. *glauca* 2
蓝波 / Buddy



蓝羊茅 / *Festuca glauca* 2
弗迪 / Freddy



墨西哥羽毛草 / *Nassella tenuissima* 2 ×
马尾 / Pony Tails



粉黛乱子草 / *Muhlenbergia capillaris* 2 ×
红宝石 / Ruby



粉黛乱子草 / *Muhlenbergia reverchonii* 2 ×
粉公主 / Rosy



班纳利提供可靠的观赏草种子供应

观赏草是全球当前的一个主要流行趋势。每一幕期望的场景总能找到一款合适的观赏草，不论何种高度、叶片颜色、开花时间以及其他等等。

而稳定的种子供应使班纳利观赏草从其他观赏草中脱颖而出。我们可持续供应高品质和高芽率的观赏草种子。

如果您想安全起见，选择班纳利！

— Amelie,
全球产品经理





闪耀的流星



莎草 / *Cyperus glaber* ☺

艾比 / Abby

新

- 圆形的植株习性
- 长在深绿色叶子上的装饰性小穗
- 极好的花束填充性植物
- 也可以作为水培植物
- 最低出芽率:86%



Z0491

艾比 / Abby	5 周	5-7 周	10-12 周	70-80 厘米	50-60 厘米	喜阳 - 耐荫	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
3-5	否	21 °C	7-14 天	1-3



兔尾草 / Lagurus ovatus ☺

小兔子 / Bunny 新


- 像兔子的尾巴, 蓬松的白色小穗
- 适合盆栽和容器生产
- 完美的景观表现
- 非常适合干花生产
- 极好的组合植物
- 最低出芽率: 84%



十分可爱的观赏草



Z0741



小兔子 / Bunny	3 周	5-7 周	8-10 周	40-50 厘米	30-40 厘米	喜阳 - 耐荫	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
3-5	否	21 °C	4-8 天	1-3



芒颖大麦草 / *Hordeum jubatum* ☺


粉雾 / Ricky 新

- 吸引人的结构性植物
- 绿色的小穗会在夏季变成玫红色
- 完美的景观和成群种植的品种
- 适合作为花束中的干花
- 最低出芽率: 84%



Z0701

夏日非凡色彩演绎



粉雾 / Ricky	4 周	6-8 周	10-12 周	60-70 厘米	40-60 厘米	喜阳 - 耐荫	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
4-6	否	21 °C	6-10 天	1-3



坡地毛冠草 / *Melinis nerviglumis* ☉ ✕

大草原 / Savannah

- 浓密的红宝石圆锥花穗, 如天鹅绒毛
- 长长的花穗在风中摇曳生姿
- 容器生产的理想选择
- 为组合盆栽或者大型景观提供完美的质地
- 耐干旱
- 最低出芽率: 84%



适合高价值组合盆栽的结构植物



Z0970

大草原 / Savannah	6-8 周	13-15 周	20-22 周	45-60 厘米	30 厘米	喜阳 - 耐半荫	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
4-6	是	21 °C	7-14 天	1-3



长柔毛狼尾草 / *Pennisetum villosum* ☉ ✕

茸毛 / Fluffy

- 白色的毛绒质感花穗
- 鲜绿色叶群
- 十分吸引眼球的单植植物
- 群植和大面积种植的绝佳选择
- 最低出芽率: 84%



Z0931

毛茸茸的吸睛利器

茸毛 / Fluffy	☹	🕒	📅	↑	↔	☀	☉☉
	4-5 周	10-12 周	14-16 周	60 厘米	40 厘米	喜阳 - 耐半荫	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
4-6	是	21 °C	3-6 天	1-3



棕色叶片美人

苔草 / Carex comans ☺

卓娜 / Zora

- 纹理精美的观赏草
- 非凡的棕色叶片
- 在混合栽培容器或花园中有多种应用方式
- 货架期极长
- 一年生的种植方式, 可以作为宿根销售——高价格
- 最低出芽率: 75%



Z0360



卓娜 / Zora	 5-7 周	 10-12 周	 16-18 周	 35 厘米	 20 厘米	 喜阳 - 半遮荫	 原种
-----------	---	---	---	---	---	--	--

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数
4-6	否	21 °C	7-14 天	1-3



蓝羊茅 / *Festuca valesiaca* var. *glauca* 2

蓝波 / Buddy

- 多用途的纹理精美的观赏草
- 市场上最好的种繁蓝羊茅品种
- 米白色圆锥花序
- 丛生的植株习性, 株型紧凑
- 常绿观赏草
- 最低出芽率: 80%



银蓝色叶群

蓝波 / Buddy	 4-5 周	 10-12 周	 14-16 周	 25-50 厘米	 40 厘米	 喜阳	 原种
每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数			
4-6	是	21 °C	7-14 天	1-3	未定	4-8	

蓝羊茅 / Festuca glauca 2

弗迪 / Freddy

- 蓝绿色叶片
- 丛生的植株习性
- 常绿植物
- 最低出芽率: 75%



Z0551



开放时, 花穗轻盈飘逸

弗迪 / Freddy	4-5 周	10-12 周	14-16 周	30-50 厘米	40 厘米	喜阳	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数		
4-6	是	21 °C	10-14 天	1-3	未定	4-8



墨西哥羽毛草 / *Nassella tenuissima* 24 x

马尾 / Pony Tails

- 花穗精致明亮
- 常绿观赏草, 叶片鲜绿色
- 群植、容器和切花生产的理想选择
- 单植时十分吸睛
- 最低出芽率: 75%



Z1081

非凡的 群植效果

注意: 本观赏草在美国部分区域被认定为具有入侵性。请与美国当地农业部确认进口条件。

马尾 / Pony Tails	4-5 周	6-7 周	12 周	60-90 厘米	30 厘米	喜阳	原种
-----------------	-------	-------	------	----------	-------	----	----

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数		
4-6	否	21 °C	6-10 天	1-3	未定	6-10



令人印象深刻的粉色花海

粉黛乱子草 / *Muhlenbergia capillaris* 2 ✕

红宝石 / Ruby

- 群植时提供精美的纹理
- 植株长势旺盛, 高度达90厘米
- 耐热和耐干旱
- 温度越高, 花芽分化和爆花效果越好
- 景观设计师的首选品种
- 最低出芽率: 74%



Z0780

红宝石 / Ruby	6-8 周	8-9 周	14-16 周	70-90 厘米	60 厘米	喜阳	原种

每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数		
4-6	否	21 °C	7-14 天	1-3	3-12	6-10



柔软的触感

粉黛乱子草 / *Muhlenbergia reverchonii* 2 ✕

粉公主 / Rosy

- 绿色叶片浓密, 呈丛生状
- 绿色叶片上开出粉红色的花序
- 与红宝石相比, 植株形态更小, 花穗更柔软
- 耐热, 耐干旱
- 温度越高, 花芽分化和爆花效果越好
- 最低出芽率: 74%



Z0790

粉公主 / Rosy	6-8 周	8-9 周	14-16 周	60-80 厘米	50 厘米	喜阳	原种


每穴播种粒数	是否覆盖	萌发温度	萌发时间	每盆种植株数		
4-6	否	21 °C	7-1 天	1-3	3-12	5-10

景观解决方案

无论是都市、休闲公园还是家庭庭院,用久经考验的班纳利观赏草打造出令人惊艳的景观效果是简单且经济的。爱上它的不仅仅是传粉昆虫!

营造美丽的空间

无论你的客户在都市还是开放空间,我们的景观精选系列都会让他们眼花缭乱。不论你的客户是大还是小,这些产品都会让他们惊叹不已!



芒颖大麦草 粉雾 / *Hordeum jubatum* Ricky



莎草 艾比 / *Cyperus glaber* Abby



兔尾草 小兔子 / *Lagurus ovatus* Bunny



芒颖大麦草 粉雾 / Hordeum jubatum Ricky

免责声明

所有信息基于我们自己的试验, 因此仅供参考。具体栽培情况因气候、地点、时间及环境条件不同而有所差异。班纳利明确表示不对此类内容/信息承担任何责任, 也不对任何所列产品的种植做出陈述或保证。建议种植者在自己条件下实行产品试验。

班纳利种子有限公司(德) Ernst Benary Samenzucht GmbH

公司地址: Friedrich-Benary-Weg 1
D-34346 Hann. Münden, Germany

benary.com

联系人: 毕正奇
电话: +86 (0) 1884 0667 999
E-Mail: taylor.bi@benary.com

联系人: 蔡海琳
电话: +86 (0) 1830 5755 011
E-Mail: helen.cai@benary.com

联系人: 张翥轩
电话: +86 (0) 1329 9067 424
E-Mail: gexuan.zhang@benary.com

